



Un régime clinique qui contribue à la dissolution et la prévention des calculs urinaires de struvite chez les chiens adultes.

## INDICATIONS

- Dissolution des calculs de struvite stériles
- Dissolution des calculs de struvite bactériens en combinaison avec une antibiothérapie adaptée
- Prévention de la récurrence des calculs de struvite
- Prise en charge des calculs de phosphate de calcium (formation et récurrence)

## CONTRE-INDICATIONS

- Utilisation simultanée d'acidifiants urinaires

## PRINCIPAUX BÉNÉFICES

### pH contrôlé



Formulé pour promouvoir une urine saine et aider à dissoudre les calculs vésicaux de struvite et les empêcher de se reformer.

### Teneur modérée en protéines



Pour aider à minimiser la disponibilité de substrat pour les bactéries produisant l'uréase.

### Aliment très appétent




Pour une excellente observance à long terme.

## BÉNÉFICES ADDITIONNELS ET CARACTERISTIQUES

**Prise en charge nutritionnelle des calculs de struvite** : Un seul régime adapté pour la dissolution et pour la prévention des calculs de struvite

**Prise en charge nutritionnelle des calculs de phosphate de calcium** : Faible teneur en calcium  
Régime acidifiant

**Aide à maintenir l'intégrité de la muqueuse de l'appareil urinaire** : Sources de glycoaminoglycane (GAGs), acides gras oméga-3 et d'antioxydants



CANINE UR	
Analyses nutritionnelles	Sec
Humidité	7,0%
Protéine	22,0%
Matières grasses	15,0%
Glucides	50,0%
Cellulose brute	1,5%
Calcium	0,7%
Phosphore	0,6%
Sodium	0,2%
Potassium	0,7%
Magnésium	0,08%
Chlorures	0,7%
Soufre	0,3%
Vitamine E	300 UI/kg
Energie métabolisable (EM)*	3,79 kcal/g
pH urinaire	5,8 - 6,2

\*Calculée

## COMPOSITION

Mais\*, gluten de maïs\*, riz\*, protéines de volaille déshydratées\*, farine de blé\*, graisse animale, hydrolysate\*, pulpe de betterave déshydratée, sels minéraux, oeufs déshydratés\*, huile de poisson. \* Sources de protéines. Substance acidifiant l'urine : sulfate de calcium.

## RATIONS ALIMENTAIRES

Une consommation accrue d'eau peut permettre de diluer l'urine et de réduire le risque de formation de cristaux. Pour dissoudre les calculs de struvite, une période d'alimentation initiale de 5 à 12 semaines est recommandée. Pour une utilisation à long terme, une période d'alimentation initiale allant jusqu'à six mois est recommandée, mais le chien doit être réexaminé régulièrement, en fonction de l'affection sous-jacente.

Laissez toujours à disposition de l'animal de l'eau fraîche et propre.

## ENTRETIEN CHEZ L'ADULTE

Poids (kg)	Ration journalière (g)
1	30
5	95
10	165
15	220
25	325
35	415
45	505
70	700



3 kg et 14 kg